

# Дермасан



## Склад

*діючі речовини:*

1 мл препарату містить: гліцерину у перерахуванні на 85 % 0,25 г; аміаку розчину 10 % 0,25 мл; етанолу 96 % 0,25 мл;

*допоміжна речовина:* вода очищена.

## Лікарська форма

Рідина на шкірну.

*Основні фізико-хімічні властивості:* прозора безбарвна рідина із запахом аміаку.

## Фармакотерапевтична група

Засоби з пом'якшувальною та захисною дією. Код ATX D02A X.

## Фармакологічні властивості

*Фармакодинаміка.*

Лікарський засіб має протизапальну та антисептичну дію, покращує еластичність шкіри.

*Фармакокінетика.*

Не вивчалася.

## Показання

Застосовують при сухості шкіри рук та тріщинах.

## Протипоказання

Підвищена чутливість до компонентів препарату; виразкові, гнійничкові, травматичні ушкодження шкіри рук.

## **Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодії**

Взаємодія невідома.

## **Особливості щодо застосування**

Не порушувати правила застосування лікарського засобу. Запобігати потраплянню в очі та на слизові оболонки. Не застосовувати при тріщинах сосків молочної залози.

При випадковому потрапленні Дермасану на слизові оболонки ока - промивати водою декілька разів (протягом 15 хвилин з перервою 10 хвилин) або 3 % розчином борної кислоти. Якщо лікарський засіб потрапив у ніс і глотку, застосовують 0,5 % розчин лимонної кислоти або натуральні соки. У разі випадкового прийому внутрішньо – пити воду, фруктовий сік, молоко, краще – 0,5 % розчин лимонної кислоти або 1 % розчин оцтової кислоти до повної нейтралізації вмісту шлунка.

*Застосування у період вагітності або годування груддю.*

Не рекомендується застосування лікарського засобу у період вагітності або годування груддю.

*Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.*

Впливу на здатність керувати автотранспортом та працювати з іншими механізмами не виявлено.

## **Спосіб застосування та дози**

Застосовують зовнішньо для дорослих. Препарат втирати у чисто вимиту з милом та добре висушену рушником шкіру рук 2 – 3 рази на день.

Термін застосування зумовлений досягнутим ефектом.

*Діти.*

Досвід застосування препарату для лікування дітей відсутній.

## **Передозування**

Не виявлено.

## **Побічні ефекти**

Подразнення, дерматити, екзема у місці аплікацій, алергічні реакції.

## **Термін придатності**

2 роки.

## **Умови зберігання**

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

## **Упаковка**

По 50 мл у флаконах; по 50 мл або 100 мл у флаконі; по 1 флакону у пачці з картону.

## **Категорія відпуску**

Без рецепта.