



**ДЕКСПАНТЕНОЛ у формі гідрофільного
крему, який має ранозагоювальну дію**

*Інструкція для медичного застосування



Пантекрем – для захисту ніжної шкіри малюків та мам



1 г крему містить 50 мг декспантенолу;

Форма випуску: крем

Фармакотерапевтична група. Засоби для лікування ран та виразкових уражень. Препарати, що сприяють загоєнню ран. Інші препарати, що сприяють загоєнню. Декспантенол

Спосіб застосування та дози.

Препарат застосовувати 1 або кілька разів на добу, залежно від потреби.

Нагляд за грудними залозами у жінок, які годують груддю: наносити крем на соски після кожного годування груддю.

Профілактичний нагляд за немовлятами: крем застосовувати при кожній зміні пелюшок (підгузка).

Тривалість лікування визначається лікарем індивідуально, залежно від наявності клінічних ознак пошкоджень шкіри.

Види поверхневих пошкоджень шкіри

хімічні, термічні, сонячні опіки



садна, подряпини



тріщини сосків



пелюшковий дерматит



- ✓ Механічне **видалення мікробів** з місця ураження
- ✓ **Боротьба з інфекцією**
- ✓ Створення умов для **швидкого ранозагоєння**

**Антисептик + ранозагоювальний компонент
+ гідрофільна основа**

- ✓ **Охолодження** (промивання холодною водою)
- ✓ **Зволоження** (після сонячного опіку шкіра зневоднена, не рекомендовано використовувати комбінації з хлорвмісними антисептиками)
- ✓ **3. Регенерація шкіри** (прискорення заживлення пошкодженої шкіри)



Без
хлорвміщуючих
антисептиків
(мірамістин,
хлоргексидин)

- ✓ У шкіри **немовлят** **слабко виражена захисна функція** організму, тому вона схильна до будь-яких хімічних, термічних, механічних факторів
- ✓ Шкіра немовляти має підвищену адсорбцію (всмоктування), тому **НЕ МОЖНА ВИКОРИСТОВУВАТИ МІСЦЕВІ ГОРМОНИ.**
- ✓ Ознаки пелюшкового дерматиту з якими **необхідно** звертатися до **лікаря-гнійники**, ерозії, тріщини, бляшки.


Повітропроникаюча основа + ранозагоювальний компонент



- ✓ Використовувати миючі засоби з рН (5,5-7,7)-аналогічний рН нормальній шкірі
- ✓ Використовувати гідрофільні креми і мазі на основі декспантенолу *

Повітропроникаюча основа + декспантенол

МЕХАНІЗМ ДІЇ ДЕКСПАНТЕНОЛУ




- ✓ Діючою речовиною препарату є декспантенол – провітамін В₅. У клітинах шкіри декспантенол швидко перетворюється у пантотенову кислоту і діє як вітамін.
- ✓ Пантотенова кислота є компонентом коензиму А (CoA). У цій формі ацетилкоензим А (CoA) відіграє центральну роль у метаболізмі кожної клітини.
- ✓ Пантотенова кислота є, таким чином, необхідною для формування і загоєння пошкоджених шкіри і слизових оболонок.

✓ Ацетилкофермент А, ацетил-коензим А, скорочено ацетил-КоА - важливе для обміну речовин з'єднання, що використовується в багатьох біохімічних реакціях. Його головна функція - доставляти атоми вуглецю з ацетил-групою в цикл трикарбонових кислот,

✓ Цикл трикарбонових кислот - це ключовий етап дихання всіх клітин, що використовують кисень, центр перетину безлічі метаболічних шляхів в організмі. Окрім значної енергетичної ролі циклу відводиться також і суттєва пластична функція, тобто це важливе джерело молекул-попередників, з яких в ході інших біохімічних перетворень синтезуються такі важливі для життєдіяльності клітини з'єднання, як амінокислоти, вуглеводи, жирні кислоти та ін. [4]

ВЛАСТИВІСТЬ	ПЕРЕВАГА	ВИГОДА
Декспантенол	Ранозагоюча дія	- Знімає симптоми пелюшкового дерматиту - Загоює шкіру
Кремова основа	Швидко всмоктується в шкіру	Зручний у використанні, не забруднює одяг
Гідрофільна основа Не вміщує антисептику	Не створює повітронепроникної плівки	- Можна застосовувати як на сухі, так і на мокнучі рани - Мінімальний ризик мікробного зараження, ускладнень
Застосовується для немовлят	Не підсушує шкіру	- Застосовується як для профілактики, так і для лікування пелюшкового дерматиту - Універсальний засіб для всієї родини



О препараті Пантекрем

Форма випуску	Діюча речовина	Режим дозування	Особливості застосування
Крем 5 %, 30 г	декспантенол	Препарат застосовувати 1 або кілька разів на добу, залежно від потреби. Нагляд за грудними залозами у жінок , які годують груддю: наносити крем на соски після кожного годування груддю. Профілактичний нагляд за немовлятами: крем застосовувати при кожній зміні пелюшок (підгузка).	Діти. Препарат застосовувати дітям різних вікових груп, включаючи немовлят.

Показання.

Препарат застосовувати для профілактичної обробки сухої, почервонілої шкіри або шкіри з тріщинами; для прискорення загоєння та епітелізації шкіри при мікропошкодженнях (незначні опіки та подряпини); при подразненнях шкіри (які є наслідком радіотерапії, фототерапії або опромінювання ультрафіолетовим світлом); пелюшковому дерматиті; для профілактичного нагляду за грудними залозами у жінок, які годують груддю, та для лікування подразнень і тріщин сосків.

Протипоказання.

Встановлена підвищена чутливість до будь-якого з компонентів препарату





Портрет споживача

- ✓ Жінки, що купляють памперси
- ✓ Жінки, що годують
- ✓ Споживачі, які потребують препарат для лікування опіків: хімічних, термічних, фото-опіки
- ✓ Споживачі, які просять засіб від загрубілої шкіри з тріщинами



Пантекрем –препарат на основі декспантенолу для профілактики і лікування пелюшкового дерматиту, тріщин сосків, які виникають в процесі годування. Пантекрем- для захисту ніжної шкіри мам и малюків.

Пантекрем – для захисту ніжної шкіри мам и малюків.

- ✓ Інструкція для медичного застосування
- ✓ В.І. Аверина, к.м.н міжнародний медичинський центр УРО_-ПРО, Москва ,
Профілактика та лікування тріщин сосків
- ✓ Дані системи роздрібної реалізації лікарських засобів Proxima Research