

РАНОСТОП

МІСЦЕВЕ ЛІКУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКА РАНОВИХ ІНФЕКЦІЙ БЕЗ ПЕЧІННЯ



Рани та ранові інфекції

актуальність проблеми

- **Рана** – це порушення анатомічної цілостності шкіри, слизових оболонок із можливим пошкодженням підлеглих тканин на всю їх товщу, а інколи також і внутрішніх органів, викликане механічним впливом



Відмінні ознаки рани:

- Біль
- Кровотеча
- зіяння



Рани та ранові інфекції

актуальність проблеми

Ранова інфекція – виникає внаслідок:

- високого рівня контамінації та високої вірулентності (заразності) мікрофлори, яка потрапляє у рану;
- наявності у рані інородних тіл, некрозів, скупчення рідини чи крові;
- пошкодження при пораненні кісток, нервів, судин;
- хронічного порушення місцевого кровообігу;
- у наслідок пізньої хірургічної обробки та загальних факторів, які впливають на розвиток ранового процесу



Рани та ранові інфекції

актуальність проблеми

Ранова місцева інфекція буває:

- Піогенна (т.б.гнійна) інфекція викликається різними бактеріями (стафілококком, синьогнойною паличкою, кишковою паличкою та іншими гноєрідними бактеріями)
- Анаеробна інфекція викликається клостридіями та неклостридіальною анаеробной мікрофлорой
- Рожисте запалення - стрептококками

При генералізації ранової інфекції розвивається сепсис



Найбільш частий розвиток піогеної ранової інфекції відбувається на 3-5 добу після поранення, рідше, в більш пізні строки – на 13-15 добу

Рани та ранові інфекції

актуальність проблеми

Важливо!

- Для профілактики - Почати лікування рани якомога раніше – одразу після пошкодження шкіри чи слизової оболонки
- Для лікування - якомога раніше після інфікування рани для НЕдопущення генералізації процесу чи залучення у рановий процес оточуючих м'яких тканин



Раностоп



Раностоп – гідрофільна антисептична мазь депо-форми йода (повідон-йод) для профілактики інфікування та лікування інфікованих ран шкіри та слизових, із широким спектром дії (активний проти вірусів, бактерій, грибів, спор та простіших), безпечний та комфортний у застосуванні (не утворює плівки, не обпікає пошкоджені тканини)



Раностоп

склад ,форма випуску, спосіб застосування

Препарат	
Склад	Повідон-йод (1г мазі містить повідон-йоду 100 мг – відповідає 10 мг/г вільного активного йоду)
Форма випуску	Мазь 10% (туба 20 г; туба 40г)



Раностоп

механізм дії



- **Повідон-йод** – це комплекс йода та полівінілпірролідона (ПВП) у вигляді ДЕПО.
- При контакті повідон-йода з біологічним матеріалом (зі шкірою та/або слизовими) відбувається ПОСТУПОВЕ РІВНОМІРНЕ вивільнення йоду.
- Йод, діє двома шляхами (див.схему), утворює із аміногрупами клітинних білків мікроорганізмів (збудників ранових інфекцій) ЙОДАМІНИ. В результаті чого відбувається коагуляція білку та загибель клітин збудників



Раностоп

показання до застосування

Препарат	
Показання до застосування	ПРОФІЛАКТИКА інфекцій при дрібних порізах та саднах, невеликих опіках та незначних хірургічних процедурах ЛІКУВАННЯ грибкових та бактеріальних інфекцій шкіри, а також інфікованих пролежнів і трофічних виразок
Спосіб застосування	Для ПРОФІЛАКТИКИ ранових інфекцій: Наносити мазь 1-2 рази на тиждень доки це необхідно Для ЛІКУВАННЯ ранових інфекцій: Наносити мазь 1-2 рази на добу не більше 14 діб



Раностоп

протипокази до застосування

- Підвищена чутливість до йоду або до будь-якого з компонентів препарату
- Гіпертиреоз
- Аденома або порушення функції щитовидної залози (вузловий колоїдний зоб, ендемічний зоб та тиреоїдит Хашимото)
- Герпетиформний дерматит Дюринга
- Період до та після терапії радіоактивним йодом
- Ниркова недостатність



5 ОСНОВНИХ переваг Раностопа

- 1 Має **ШИРОКИЙ СПЕКТР ДІЇ** проти різних збудників: бактерій, вірусів, найпростіших мікроорганізмів та грибків. Резистентність, в т.ч. вторинна, при тривалому застосуванні не очікується
- 2 Не обпікає шкіру та слизові оболонки: у складі препарату - **повідон-йод**
- 3 **НЕ УТВОРЮЄ ПЛІВКИ** на поверхні рани, так як випускається у формі гідрофільної мазі
- 4 **ПОПЕРЕДЖУЄ** ранові інфекції при гострих саднах, подряпинах і дрібних порізах, невеликих опіках
- 5 **ЛІКУЄ** грибкові та бактеріальні інфекції шкіри, інфіковані пролежні та трофічні виразки



Раностоп

аналіз основних конкурентів

Бренд	Склад	Переваги РАНОСТОПУ
Бетадин (Эгис) Випускається у формах: Розчину Свічок мазі	Мазь: 20г	1 Раностоп доступніший за ціною 2 Має дві форми випуску: 20г, 40г. 3 Виготовлений в Україні
Левомеколь (Фармак та ін. Вітчизняні виробники)	В 1 г мазі Левомецитин 7,5 мг Метилурацил 40 мг 40 г	1 До складу входить йод, який має бактерицидну та бактериостатичну дію 2 Випускається у формі повідон-йоду – йод у формі ДЕПО (повільне та рівномірне вивільнення йоду з поверхні шкіри)



Раностоп

портрет пацієнта

- Пацієнти з інфікованими ранами (пошкодженнями шкіри): трофічними виразками, пролежнями, невеликими опіками, забрудненими ранами
- Пацієнти з неінфікованими ранами, але вже підсушеними ранами (після стадії ексудації), після незначних хірургічних процедур



РАНОСТОП



МІСЦЕВЕ ЛІКУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКА РАНОВИХ ІНФЕКЦІЙ
БЕЗ ПЕЧІННЯ

Інформація для медичних та фармацевтичних спеціалістів.
Детальна інформація в інструкції для медичного застосування препарату.

